

CATALOG



www.ecoferma.ro



www.agroest.ro

Viitorul este Ecologic!

Într-o lume în care produsele ecologice devin tot mai căutate, numeroase și variate, în care resursele devin mai prețioase, iar calitatea nutrițională este o condiție esențială, nu mai este cazul să căutăm și alte dovezi că direcția agriculturii este una „verde” și sănătoasă.

Într-un proces amplu, plecat de la genetica produselor pentru agricultură și până la consumatorul final, reflexele de consum tradiționale se transformă într-un ritm alert. Tot mai mulți oameni sunt deosebit de atenți la alimentație, indiferent dacă este vorba despre fructe, legume, cereale, sau produse de origine animală. Suntem mult mai atenți la problemele de mediu, ne dorim conservarea resurselor și pentru generațiile viitoare.

Acum 20 de ani, agricultura ecologică părea un obiectiv aproape imposibil. Astăzi, este unul realizabil, pentru că avem disponibile toate categoriile de produse necesare lanțului tehnologic, de la sămânță și până la ultimul tratament, pentru a obține producții foarte bune. Tehnologia este astăzi parte a agriculturii, prin produse inovatoare și prin smart-agricultură.

Agro-Est Muntenia a decis să investească într-un portofoliu complet de produse destinate agriculturii ecologice, pentru ca fermierul român să poată avea soluții performante. În acest catalog veți găsi fungicide, insecticide, insecto-fungicide, biostimulatori, fertilizanți foliari, tratamente pentru sol, toate având certificare ECO.

Însă ele sunt recomandate și pentru agricultura intensivă, unde portofoliul de soluții de sinteză autorizate scade în fiecare an, iar produsele eco sunt o soluție performantă, inclusiv pentru producătorul tradițional.

ECKLOMAR	01
BEET	02
GLAUCUS	03
SM-6	04
FLORACAL	05
ROMBI BORO	06
PLYSETUM	07
MAXITINA	08
ORTIMAG	09
PREV-AM	10
ALCYGOL B2M	11
ALCYGOL Z2M	12
FIXA CU	13
AMYLIS	14
OCEANUM	15
LITHOVIT BOR	16
ECOBOR	17



Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat InterEco.

Descriere produs:

Ecklomar este un fertilizant rezultat din sinergia dintre extractul de alge de mare din kelp (*Eklonia maxima*) și microelemente, în scopul creșterii cantității și calității producției.

Alga de mare *Eklonia maxima*, conține o cantitate mare de fitohormoni naturali, betaina, manitol, acid alginic, citokinine, gibereline dar și alte substanțe active, care împreună, au un foarte puternic efect de biostimulare, pentru următoarele procese importante în timpul vegetației: creșterea vegetativă, înflorirea, formarea și creșterea fructelor.

Datorită compoziției, Ecklomar furnizează plantelor principalele elemente de care acestea au nevoie, pentru a avea cel mai bun răspuns de la culturile la care se aplică, cantitativ, calitativ și nutrițional.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

La toate culturile, doza la care se utilizează este de 2.0 - 3.0 litri/ha/aplicare.

La culturile de legume, tratamentele se efectuează în perioada de creștere activă, începând cu faza de 4 frunze și se repetă apoi, înaintea înfloririi și la începutul formării fructelor.

La pomii fructiferi, primul tratament se efectuează la începutul înfloririi, următorul la începutul formării fructelor și ultimul în perioada de creștere a fructelor.

La cerealele păioase și rapiță tratamentul se poate aplica la desprimăvărare sau în perioada preflorală.

La culturile de floarea-soarelui și porumb momentul optim este în stadiul de 6-8 frunze.

Ambalaj: 5 L sau 20 L

Compoziție w/v :

Extract de alge

Eklonia maxima 92%.

Bor (B): 0.43%.

Cupru chelatat (Cu): 0.16%.

Fier chelatat (Fe): 0.59%.

Mangan chelatat (Mn): 0.65%.

Molibden chelatat (Mo): 0.03%.

Zinc chelatat (Zn): 0.32%.

Ph 5.56, densitate 1.08 g/cc.

ECKLOMAR



Recomandări de aplicare :

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius. Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Compatibilitate:

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.





Recomandări de aplicare :

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius. A nu se aplica foliar în timpul perioadelor de înflorit.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Compatibilitate:

Beet nu se amestecă cu produse pe bază de fosfiți, cupru sau sulf.

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.

Compoziție w/v :

Materie organică naturală : 52%.

K2O : 9.1%.

P2O5 : 0.91%.

Extract humic : 31.2%.

Azot (N) : 1.95%.

Aminoacizi liberi : 7.8%.

Ph 6.5, densitate 1.3 g/cc.



Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat InterEco.

Descriere produs:

Beet este un extract natural de sfeclă de zahăr, foarte concentrat, care stimulează simultan dezvoltarea foliajului și a sistemului radicular. Se remarcă prin conținutul foarte ridicat în materie organică, aminoacizi, potasiu de origine vegetală și extract humic.

Spre deosebire de alți fertilizanți la care potasiul este adăugat ca sare, în acest produs TOATE componentele, inclusiv potasiul, provin din plante și sunt extrase prin metode fizice care îl certifică pentru agricultura organică sau biologică.

Beet îmbunătățește substanțial construcția unei plante bine dezvoltate și ajută plantele să se refacă după situații de stres cauzate de factori precum temperaturile extreme, secetă sau fitotoxicitatea.

Efectul celor trei componente de bază este o calitate de excepție a legumelor și fructelor, colorația uniformă și intensă, dar și greutatea mai mare a acestora. Beet păstrează o relație N / K2O de 1,5 / 8, pentru a nu favoriza apariția bolilor. Cu toate acestea, conținutul său în aminoacizi stimulează în același timp dezvoltarea puternică a plantei.

Beet poate fi utilizat foliar, prin fertigare sau pentru aplicarea la sol.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Doza va fi corelată cu strategia generală de fertilizare, ținându-se cont de necesitatea unei fertilizări suplimentare.

Aplicare prin fertigare: la culturile horticole (legume, pomi fructiferi) : 15-20 l/ha, maxim două aplicări.

Aplicare foliară: pentru pomi fructiferi 2.5 l/ha/aplicare. Se efectuează 2-3 aplicări la interval de 15 zile. Pentru legume, doza este de 1.5-2.0 litri/ha, în funcție de necesarul de potasiu. Se efectuează 2-3 aplicări pre și postflorale, la interval de 15 zile între ele.

Aplicare la sol: 40-80 l/ha.

Ambalaj: 5 L sau 20 L

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat InterEco.

Descriere produs:

Glaucus este o formulă inovatoare, concepută ca și corector de cupru, cu capacitate de vindecare, atât pentru utilizarea foliară cât și pentru utilizarea radiculară. Prin cele două substanțe active (acidul gluconic și cuprul solubil), reduce turgescența în frunze, are efect asupra nodulării legumelor și favorizează formarea semințelor. Este utilizat ca supliment pe bază de cupru în planul de fertilizare, stimulând în paralel procesele metabolice. Poate fi aplicat într-o gamă largă de culturi.

Cuprul este necesar în multe procese biochimice, formând diferite enzime care au un impact favorabil asupra: fotosintezei, metabolismului, carbohidraților și azotului. Cuprul reglează transportul electo-fotosintetic și reduce toxicitatea molibdenului. Participă la formarea proteinei și a vitaminei A, este cofactorul diferitelor enzime din nutriția vegetală.

Glaucus a fost formulat în cadrul anumitor parametri pentru utilizare în condiții de siguranță la dozele indicate, deși, atât pentru aplicarea foliară, cât și radiculară, suplimentele totale de cupru acumulate trebuie să fie luate în considerare, astfel încât limitele de toxicitate să nu fie depășite.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Glaucus se utilizează la culturile de grâu, pomi fructiferi, legume, viță de vie, în următoarele doze:

Prin aplicare foliară, doza recomandată este de 1.5-2.5 l/ha, maxim două tratamente, cu pauză de minim 15 zile între ele.

Prin fertigare (doar la legume) : 2-2.5 l/ha, maxim două tratamente, cu pauză de 15 zile între ele.

Ambalaj: 5 L sau 20 L

Compoziție w/v :

Cupru solubil (Cu): 7.15%
Cupru cu acid gluconic : 7.15%
Ph 2.9



GLAUCUS



Recomandări de aplicare :

Dacă se aplică foliar, Glaucus nu se amestecă, el se aplică singur. Nu se utilizează în cazul în care cultura este afectată de secetă puternică, inundație, șoc termic. Se evită utilizarea la temperaturi de peste 25 de grade Celsius. A nu se aplica foliar în timpul perioadelor de înflorit. Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Compatibilitate:

Glaucus nu se folosește în amestec cu produse puternic alcaline, cu alte produse pe bază de cupru sau în amestec cu produse pe bază de aminoacizi. Nu se amestecă cu produse pe bază de calciu, azot, sulf sau fosfor. Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat InterEco.



Compoziție w/v :

Extract pur de Ascophyllum nodosum 31%.
Manitol 2.32%
Acid alginic 6.9%
Ph 5. Densitate 1.16 g/cc.

Descriere produs:

SM-6 este un biostimulator certificat ecologic, obținut exclusiv prin extracția apoasă la temperatură scăzută, fără a folosi extracția chimică. Astfel, toate valorile naturale ale extractului de alge *Ascophyllum nodosum* sunt păstrate în SM-6, având o activitate citokinetică echivalentă cu 2000 ppm de kinetină. Citokininile îmbunătățesc mobilizarea nutrienților către punctele de creștere, stimulează diviziunea celulară și ajută planta să reziste la diferite tipuri de tensiuni biotice și abiotice, făcând țesuturile să reziste mai bine procesului de îmbătrânire (degradarea clorofilei). SM-6 stimulează încolțirea și răsărirea, dezvoltarea echilibrată și creșterea fructelor, putând fi utilizat atât foliar, cât și prin fertigare. Are un efect vizibil de creștere a gradului de polenizare, fiind recomandat în utilizarea perioadelor prefloreale.

Modul de utilizare și dozele recomandate:

SM-6 se poate utiliza

Prin fertigare : 2 l/ha, maxim trei tratamente, cu o pauză de 15 zile între ele.

Prin aplicare foliară:

Vița de vie: 2-3 l/ha, de la desprindere până la perioada de înflorire.

La dezvoltarea fructelor. Maxim două tratamente, cu pauză de 15 zile între ele.

Legume : 2-3 l/ha, de la transplantare până la recoltare. Maxim trei tratamente, cu pauză de 10 zile între ele.

Pomi fructiferi : 3 l/ha, înaintea perioadei de înflorit, de la formarea fructelor până la coacere.

Maxim două tratamente, cu pauză de 15 zile între ele.

Cereale păioase : 2 l/ha, la desprindere, în faza de burduf sau înaintea perioadei de înflorit.

Porumb : 2 litri/ha, între 4-6 frunze sau între 8-10 frunze. Maxim două tratamente.

Floarea-soarelui : 2 l/ha, între 5-8 frunze sau înaintea perioadei de înflorit.

Rapiță : 2 l/ha, toamna, dacă răsărirea este întârziată sau înaintea perioadei de înflorit.

SM-6 poate fi utilizat la toate culturile, în special pentru a trece peste perioadele dificile de stres, în perioadele de dezvoltare susținută, de stimulare a polenizării și de dezvoltare a fructelor.



Recomandări de aplicare :

Dacă se aplică foliar, SM-6 nu se utilizează la temperaturi de peste 25 de grade Celsius. Este compatibil cu majoritatea produselor de nutriție și de protecție a plantelor. Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Ambalaj: 1 L sau 20 L

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat InterEco.

Descriere produs:

Floracal este o formulă avansată, solubilă 100%, suspensie concentrată de calciu, pentru a acoperi necesarul plantei, cu maximă eficiență. Floracal satisface nevoile de calciu ale culturilor pe solurile acide sau saline, îmbunătățind în același timp calitățile fizico-chimice ale solului, fiind un produs cu utilizare prin fertigare. Aceasta este inovația Floracal - acoperă necesarul nutrițional, corectând în același timp și calitatea solului. Nu conține cloruri sau azot.

Este un produs indicat pentru plantațiile de pomi fructiferi, viță de vie, culturi horticoale industriale, căpșuni, tomate, arbuști fructiferi, varză și conopidă.

Modul de utilizare și dozele recomandate:

Floracal ar trebui utilizat încă de la începutul perioadei de vegetație, în funcție de tipul de sol, în baza unei analize a solului. În funcție de tipul de sol, doza poate fi cuprinsă între 50-100 kg/ha, cu o doză medie de 3.5 kg/ha în timpul perioadei de dezvoltare intensă.

La toate culturile, poate fi folosit în funcție de tipul de sol :

Pe solurile normale : 60 kg/ha (36 l/ha).

Pe solurile acide : 80 kg/ha (50 l/ha).

Pe solurile saline : 80 kg/ha (50 l/ha).

La culturile horticoale doza indicată este de 4 kg/ha/săptămână iar la căpșuni de 3/kg/ha/săptămână.

Ambalaj: 1 L sau 5 L

Compoziție w/v :

Oxid de calciu (CaO) 56.7%.

Calciu total : 40.5%.

Valoarea neutralizării : 35

Ph 7.7 . Densitate 1.62 g/cc.



FLORACAL



Recomandări de aplicare :

Floracal nu se amestecă cu alte produse în timpul utilizării.

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat InterEco.



Compoziție w/v :

Bor (B): 15%

Descriere produs:

Rombi Boro este un fertilizant foliar certificat ECO, formulat ca și concentrat lichid de bor, cu o concentrație de 15%. Adjuvanții îl transformă într-un produs 100% asimilabil de către plantă. Borul joacă un rol important pentru asigurarea unei creșteri normale a plantelor de cultură și pentru îmbunătățirea unor indici de calitate ai recoltei (conținutul în ulei la plantele oleaginoase, conținutul în zahăr la sfeclă).

Borul mărește fertilitatea florilor pentru că stimulează producerea de polen și îmbunătățește viabilitatea acestuia.

Deficiența în bor se manifestă prin: moartea vârfurilor de creștere, care rămân pitice, apariția crăpăturilor sau brunificarea țesuturilor în sistemul radicular sau la nivelul tulpinilor.

Recomandări de aplicare :

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Compatibilitate:

A nu se amesteca cu produse pe bază de fosfați sau sulfuri.

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.



Modul de utilizare și dozele recomandate :

Se aplică foliar.

Rapiță: 2 l/ha. Primul tratament în faza de patru frunze și al doilea tratament la desprindere.

Floarea-soarelui: 2 litri/ha, în faza de 6-8 frunze.

Căpșun: 1.5-2 l/ha, 2 tratamente la interval de 15 zile.

Rădăcinoase : 2 l/ha, când plantele au 10 cm înălțime.

Fasole, mazăre, varză, salată : 2 l/ha, 2-3 aplicări, la interval de 15 zile.

Sfeclă de zahăr: 2.5 l/ha, primul tratament înainte ca plantele să acopere spațiul dintre rânduri. Maxim două-trei tratamente la interval de 14 zile.

Pomi fructiferi : 1.5-2 l/ha, cu repetare la 15-20 de zile.

Viță de vie : 1-1.5 l/ha.

Ambalaj: 1 L sau 20 L

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică,
în conformitate cu Regulamentul CE 1107 / 2009. Produs certificat InterEco.

Descriere produs:

Plysetum este un biofungicid bazat pe extractul de Equisetum Arvense L („coada calului”), obținut prin macerarea și decoctiunea (fierberea și dizolvarea) ulterioară a părților aeriene. Utilizarea acestei substanțe permite prevenirea bolilor, întărirea peretelui celular al plantelor și limitarea numărului de tratamente fitosanitare cu produse sintetice, reducând astfel nivelul rezidurilor toxice din culturi și recolte.

„Coadă-calului” este o plantă pteridofită care crește în emisfera nordică și este considerată o substanță antifungică de bază, în conformitate cu Regulamentul European (CE) 1107/2009. Plysetum mai conține și fenoli, flavonoide, acid silicic și cafeic. În plus, conform SANCO 12386/2013, extractul de Equisetum arvense are un puternic efect de stimulare al mecanismului natural de apărare al plantei.

Plysetum acționează foarte bine împotriva rapanului „Venturia inaequalis”, mucegaiului la măr și păr „Podosphaera”, bășicării frunzelor „Taphrina deformans”, mucegaiului la curcubitacee „Podosphaera xanthii”, mucegaiul de apă din sere și solarii „Pythium species”, alternariozei, în special la tomate „Alternaria solani”, manei, în special la vița de vie „Plasmopara viticola”, putregaiului la vița de vie.

La legumele din spațiile protejate, Plysetum poate fi folosit pentru combaterea bolilor sistemului radicular, în special a mucegaiurilor.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Pomi fructiferi - între 2 și 6 aplicări la interval de minim 7 zile, doza recomandată 50-100 cc/HL.

Castravete - de la 9 sau mai multe frunze, 2 tratamente la interval de 3-4 zile, în doză de 50-100 cc/HL.

Tomate - de la prima inflorescență vizibilă - 2 aplicări la interval de minim 14 zile, în doză de 50-100 cc/HL.

Vița de vie – până la dezvoltarea inflorescenței, 2-6 aplicări, la interval de minim 7 zile, în doză de 50-100 cc/HL.

Compoziție w/v :

Equisetum arvense L extract

lichid: 1,98 % p/p;

2,00 % w/v (20g/L)

pH = 4,90

Densitatea = 1,008 g/cc



PLYSETUM



Recomandări de aplicare :

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât mai repede după deschidere.

A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării. Sfaturile și informațiile pe care le oferim provin dintr-un studiu larg, și multe teste în cultură. Cu toate acestea, atunci când folosiți produsul, pot apărea mulți factori care depășesc controlul nostru (prepararea amestecului, aplicarea, vreme etc.), prin urmare, vă recomandăm să respectați normele de utilizare.

Compatibilitate:

De preferat să se aplice singur, fără a fi amestecat cu alte produse fitosanitare.

Ambalaj: 1 L sau 20 L



Recomandări de aplicare :

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât mai repede după deschidere.

A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării. Sfaturile și informațiile pe care le oferim provin dintr-un studiu larg, și multe teste în cultură. Cu toate acestea, atunci când folosiți produsul, pot apărea mulți factori care depășesc controlul nostru (prepararea amestecului, aplicarea, vreme etc.), prin urmare, vă recomandăm să respectați normele de utilizare.

Compatibilitate:

De preferat să se aplice singur, fără a fi amestecat cu alte produse fitosanitare.

Ambalaj: 1 L sau 20 L

Compoziție w/v :

Substanța de bază – lecitina.
Concentrat lichid emulsionabil.
Extract de lecitină 100%
pH 5,0
Densitate 1,08 g / cc



Descriere produs:

Maxitina este un produs natural, un biofungicid pe bază de lecitină din soia, care conține substanțe precum fosfolipide, acizi grași esențiali, colină, inozitol, fosfor și vitamina E. Lecitinele sunt clasificate ca substanțe de bază ale acțiunii fungicidului, conform raportului SANCO 12798/2014 și acestea sunt reglementate de articolul 23 din Regulamentul (CE) 1107/2009, privind comercializarea produselor fitosanitare.

Maxitina crește fermitatea, îmbunătățește consistența, strălucirea și culoarea fructelor și legumelor, reduce afecțiunile plantelor, ajută la vindecarea unor leziuni mici și are un efect stimulant, revigorând cultura.

Maxitina combate mucegaiul la mere și pere „*Podosphaera leucotricha*”, bășicarea frunzelor la cais și piersic „*Taphrina deformans*”, mana viței de vie „*Plasmopara viticola*”, făinarea „*Erysiphe necator*”, mana la tomate „*Phytophthora infestans*”. Este un produs foarte bun în combaterea manei, făinărilor și mucegaiurilor.

Avantajele utilizării produsului Maxitina: oferă o apărare naturală împotriva dăunătorilor/ciupercilor, cu risc minim pentru utilizator și consumator, utilizarea sa permite prevenirea incidenței bolilor și limitarea tratamentelor cu produse fitosanitare de sinteză, reduce impactul asupra mediu înconjurător.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Maxitina se poate aplica **foliar** sau **radicular**.

Pentru tratamentul foliar se recomandă următoarele doze :

Viță de vie și plante ornamentale : 100-225 g/ha, 100-200 cc/ha.

Pomi fructiferi : 450-750 g/ha, 450-700 cc/ha.

Legume, tomate, castraveți, cereale : 1500-2300 g/ha, 1400-2100 cc/ha.

Arbuști fructiferi : 1200-1800 g/ha.

Timp de pauză : 5 zile la toate culturile, cu excepția viței de vie, unde timpul de pauză este de 30 de zile.

Dacă se dorește utilizarea ca biostimulant, doza este de 2.000-3.000 gr/ha.

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică,
în conformitate cu Regulamentul CE 1107 / 2009. Produs certificat InterEco.

Descriere produs:

Ortimag este un bio fungicid, insecticid și acaricid, având ca substanță activă extractul concentrat de Urtica (Urzică). Extractul de urzică este o substanță de bază, folosită în protecția plantelor ca insecticid, acaricid și fungicid (raport SANTE / 11809/2016).

A fost dezvoltat sub Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru a oferi un instrument natural și cu impact scăzut împotriva bolilor și dăunătorilor precum: păduchele verde al piersicului „Myzus persicae”, păduchele trandafirului „Macrosiphum rosae”, păduchele lanos „Eriosoma lanigerum”, păduchele negru al cireșului „Myzus cerasi”, viermele mărului „Cydia pomonella”, mucegaiul frunzelor „Alternaria alternata”, monilioza sâmburoaselor „Monilia laxa”, putregaiul cenușiu „Botritis cinerea”, mucegaiul negru „Rhizopus stonolifer”, afide, puricele vârgat al rapiței „Phyllotreta nemorum”, molia verzei „Plutella xylostella”, acarianul roșu comun „Tetranychus urticae”, mana „Phytophthora infestans”, alternarioze și mucegaiuri.

Extractul de urzică are o compoziție care îi permite utilizarea ca bioinsecticid, bioîngrășământ sau biostimulator pentru plante. În plus, are un conținut bogat în microelemente, precum fierul și manganul, dar și elemente secundare, precum sulf, siliciu și magneziu. Este cunoscut, de asemenea, efectul repelent asupra insectelor, dar și efectul său preventiv împotriva ciupercilor, datorită siliciului.

Ortimag stimulează microorganismele benefice din sol, îmbunătățește producția de clorofilă în plante și corectează deficiențele nutriționale, acesta putând fi folosit și ca îngrășământ. Favorizează descompunerea materiei organice, îmbunătățește dezvoltarea sistemului radicular, crește conținutul de zaharuri în fructe și gradul de fructificare.

Ambalaj: 1 L sau 20 L

Compoziție w/v :

Urtica: 1,50 % w /v
pH: 6,0
Densitatea: 1,02 g/cc



ORTIMAG



Modul de utilizare și dozele recomandate :

Ortimag se aplică foliar. La culturile de prun, cireș, piersic, cais, măr, păr, alun, coacaz, viță de vie, mazăre, cartof, castravete, salată, varză, tomate, rapiță, grâu, doza recomandată este de 50-100 cc/L. Dacă produsul este folosit pentru uz general, timpul de pauză este de 7 zile, iar ca insecticid, acaricid și fungicid între 7-10 zile.

Recomandări de aplicare :

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât mai repede după deschidere.

A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării. Sfaturile și informațiile pe care le oferim provin dintr-un studiu larg, și multe teste în cultură. Cu toate acestea, atunci când folosiți produsul, pot apărea mulți factori care depășesc controlul nostru (prepararea amestecului, aplicarea, vreme etc.), prin urmare, vă recomandăm să respectați normele de utilizare.

Compatibilitate:

De preferat să se aplice singur, fără a fi amestecat cu alte produse fitosanitare.



Recomandări de aplicare :

Funghi ectoparaziți și stadii ale insectelor cu piele moale și de asemenea la aplicările la temperaturi ridicate: doza $\geq 0,4\%$ adică 400cc/100L de H₂O. Stagiile cu piele dură a insectelor, ouă și condiții grele de aplicare: doza = 0,6% adică 600cc/100L of H₂O. În tank-mixuri și pentru a evita condițiile de fitotoxicitate: doza $\leq 0,3\%$ adică 300cc/100L de H₂O.

Compatibilitate:

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.

Compoziție w/v :

Ulei de portocale 60 g/l.



Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat.

Descriere produs:

PREV-AM este un fungicid, insecticid și acaricid de contact, certificat ecologic, pe bază de ulei de portocale 60 g/l.

Ca și insecticid, PREV-AM acționează prin patru moduri: desicare (exoscheletul osos sau articulații), distrugând tensiunea aripilor, sufocare (inundând tuburile respiratorii) și fecunditate (inhibarea femelelor să depună ouă). PREV-AM a avut rezultate foarte bune în combaterea moliilor, fluturilor, musculiței albe, afidelor, tripsilor, puricilor, păianjenului roșu și nu atacă insectele benefice sau albinele.

Ca și fungicid, PREV-AM acționează prin desicare, afectând structura externă a fungilor, descompunând straturile ceroase protective și accelerând timpul de uscare pentru rouă. Are un efect curativ imediat asupra putregaiurilor. Combate eficient făinarea, mana, rugina, alternarioza, mucegaiul.

Nu are efect rezidual și poate fi folosit până în momentul recoltării, fără restricții. Pot fi realizate până la șase tratamente, cu timp de pauză de 7-10 zile între tratamente, pentru eficiența economică a produsului. Poate fi folosit în siguranță în câmp, dar și în spații închise, în sere și solarii.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Se aplică foliar.

Viță de vie : 1.6 l/ha. (0.4%).

Legume : 2-6 l/ha (0.4%-0.8%).

Pomi fructiferi : 2-5 l/ha (0.4%-0.8%).

Cartof, soia, cereale (0.3%-0.8%).

Ambalaj: 1 L sau 10 L

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică,
în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat BioAgn.

Descriere produs:

Alcygol B2M este produs dintr-o algă brună originală din Bretania franceză peninsulară (nordul oceanului Atlantic), o algă care produce molecule capabile să crească rezistența la stres, atât la nivel de plantă cât și la nivel celular.

Alcygol B2M: Stimulează dezvoltarea rapidă.

Crește calitatea nutrițională.

Îmbunătățește dezvoltarea sistemului radicular.

Stimulează înflorirea timpurie.

Are ca efect maturarea și dezvoltarea uniformă a fructelor.

Menține integritatea membranelor celulare.

Crește concentrația de antioxidanți.

Alcygol B2M este o formulare originală, care combină vitalitatea marină cu borul, magneziul și manganul. Extractele naturale de alge marine îmbunătățesc asimilarea ingredientelor active prin absorbție foliară. Se îmbunătățește capacitatea de umectare și lipire a compușilor, pentru a asigura un timp de absorbție mai bun și pierderi reduse din cauza spălării. Cristalizarea este de asemenea evitată, pentru că reduce evaporarea apei, rezultând o rată de absorbție de 80-90%.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Viță de vie - 3l/ha. Înainte și după înflorire.

Pomi fructiferi - 3l/ha. Înainte/după înflorire și la formarea fructelor.

Legume - 3-4l/ha. 1-2 aplicări. După transplantare / răsărire, după formarea fructelor.

Cereale Păioase - 2 l/ha. Primăvara devreme sau în faza de burduf.

Rapiță - 2.5 l/ha. La începutul alungirii tulpinii.

Ambalaj: 10 L

Compoziție w/v :

Extracte de alge de origine naturală

ASCOPHYLLUM NODOSUM.

Magneziu (MgO): 50 g / L

Sulf (SO₃): 110 g / L

Bor (B): 27 g / L

Mangan (Mn): 10 g / L

ALCYGOL B2M



Recomandări de aplicare :

Se aplică foliar. Volumul de soluție este de 200 l/ha la culturi de câmp, 400 litri/ha la cartof, 600-800 litri/ha la legume, 1000 litri/ha la pomi fructiferi și vița de vie. Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius. Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul. A se păstra departe de îngheț în ambalajul original ferit de lumina directă a soarelui și bine închis.

Compatibilitate:

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Co-aplicarea este făcută cu riscul utilizatorului final. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.



Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat BioAgn.



Compoziție w/v :

Extrakte de alge de origine naturală ASCOPHYLLUM NODOSUM.

Magneziu (MgO): 50 g / L

Sulf (SO₃): 205 g / L

Mangan (Mn): 41 g / L

Zinc (Zn): 39 g / L

Descriere produs:

Alcygol Z2M este un extract natural de alge, asociat cu nutrienți. Prin selecția unei alge brune din nordul Oceanului Atlantic, care are proprietatea de a produce molecule ce vor crește rezistența la stres atât la nivelul plantei cât și la nivel celular. Alcygol Z2M stimulează dezvoltarea, crește calitatea nutrițională a recoltei, dezvoltă sistemul radicular, ajută înflorirea și polenizarea, generează o mărime uniformă a fructelor și crește rezistența peretelui celular.

Alcygol Z2M este o formulare originală și unică, care combină proprietățile naturale ale algelor marine cu magneziul, manganul, sulful și zincul.

Datorită concentrațiilor de zinc și magneziu, Alcygol Z2M previne și corectează eficient deficiențele tuturor culturilor.

Recomandări de aplicare :

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Compatibilitate:

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.



Modul de utilizare și dozele recomandate :

Se aplică foliar.

Porumb : 2.5-4l/ha. Concentrație maximă 2.5%. 1-2 aplicări, de la stadiul de 5-6 frunze.

Soia : 3-4 l/ha. Concentrație maximă 2.5%. Un tratament în faza de 2-4 frunze.

Rapiță : 3 l/ha. Înainte de începerea procesului de alungire a tulpinii.

Floarea-soarelui : 2-3 l/ha.

Cereale păioase : 2-3 l/ha. Concentrație maximă 2.5%. Primăvara, la începutul împăierii.

Pomi fructiferi (a nu se folosi la CAIS) – 3l/ha. Concentrație maximă 2,5%.

1-2 aplicări înainte și după înflorire. O a treia aplicare poate fi necesară în faza de dezvoltare susținută a fructelor.

Legume (fasole, ceapă, usturoi, mazăre,) cât și alte culturi sensibile la deficiență de Zn și Mn - 5l/ha. Concentrație maximă 2,5%.

1-2 aplicări pe frunzele bine dezvoltate.

Ambalaj: 10 L

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat BioAgn.

Descriere produs:

FIXA Cu corectează deficiențele în cupru la toate culturile, prin aplicarea foliară sau la nivelul solului.

FIXA Cu garantează un nivel ridicat al producției, combinând cuprul și sulful în forme lichide puternic concentrate, certificate pentru agricultura ecologică. Lignosulfonații din FIXA Cu au o acțiune blândă asupra aparatului foliar, fiind un produs lichid sigur și ușor de utilizat.

Prin utilizarea a două tratamente la un interval de 10-14 zile, se asigură protecția împotriva unor boli precum bacterioza, monilioza, mana, arsura bacteriană și rapănul.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Se aplică foliar.

Cereale păioase : 2 l/ha, la desprăvărare sau 1 l/ha după al doilea internod.

Pomi fructiferi : 2-3 l/ha primăvara devreme sau toamna, după înflorit sau la căderea frunzelor.

Viță de vie : 2-3 l/ha primăvara devreme, după înflorit sau toamna după recoltat.

Legume (tomate, ardei, vinete) : de la a patra frunză și până la coacere, cu timp de pauză de 7 zile până la recoltare.

Cartof : 2-3 l/ha, de la a patra frunză până la înflorit.

Interval minim între tratamente : 10 zile.

Ambalaj: 10 L

Compoziție w/v :

Sulf (SO₃) – 146 g / l.

Cupru (Cu) – 120 g / l.



Recomandări de aplicare :

Aplicare foliară (2-3 l/ha) sau la sol (3-5 l/ha).

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius. Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul. Cantitatea minimă de apă : 200 litri/ha.

Pentru pomi fructiferi și vița de vie se recomandă o cantitate de soluție de 800-1000 litri.

Compatibilitate:

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.



**Recomandări de aplicare :**

Amylis se poate aplica pe resturile vegetale din câmp, dimineața sau seara, pentru a evita expunerea excesivă la razele UV. Executați lucrarea solului în următoarele 24 de ore de la aplicare : arat, discuit sau semănat. Amylis poate fi aplicat pe stratul vegetal răsărit sau imediat după semănat, atât toamna cât și primăvara. Nu utilizați tratamentele cu erbicide la mai puțin de 5 zile înaintea aplicării sau după utilizarea tratamentului cu Amylis.

Compatibilitate:

Se poate amesteca cu soluțiile pe bază de azot.

Amylis poate fi utilizat împreună cu fertilizanți foliari, insecticide sau fungicide, însă recomandăm realizarea unui test de compatibilitate – în acest caz Amylis se aplică la final, după diluția celorlalte produse. Nu utilizați produse care pot conține clor – acestea distrug bacteriile din produs.

Ambalaj: 5 L

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat BioAgn.

Descriere produs:

Amylis crește activitatea biologică a solului, fiind aditivul microorganismelor vii din sol, prin conținutul de *Bacillus amyloliquefaciens*. Solul optimizat cu Amylis eliberează o cantitate suplimentară de azot echivalentă cu 20-25 UN/Ha.

Amylis reprezintă o combinație între două bacterii fixatoare de azot pentru sol. Aceste bacterii au proprietăți similare, dar toleranțe diferite la condițiile pedoclimatice. Temperatura lor optimă de dezvoltare este diferită. Scopul este acela de a optimiza șansele de implantare și de dezvoltare prin acoperirea tuturor situațiilor posibile legate de temperatura, pH-ul și tipul de sol. O tehnologie inovativă care va activa viața solului, va fixa azotul, va solubiliza fosforul, va stimula producerea fitohormonilor și dezvoltarea sistemului radicular. Amylis reduce considerabil și levigarea azotului în sol.

Astfel, Amylis facilitează fixarea azotului atmosferic pentru plantă, dar și prin utilizarea materiei organice din sol, întărește sistemul radicular, îmbunătățește procesul de germinație și accelerează răsărirea, optimizează asimilarea fosforului, a fierului, a borului și a magneziului, îmbunătățește considerabil activitatea microbiologică din sol.

Amylis distruge flora patogenă sau oportunistă din rizosfera, asigurând o dezvoltare sănătoasă a sistemului radicular.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Bacteriile fixatoare de azot își găsesc hrana în rezidurile de carbon din cultură, furnizând o sursă de energie suficientă pentru a fixa moleculele de azot din aer.

Amylis captează 2 surse de azot:

Nitrații de sol - faza de asimilare și mobilizare a azotului.

Azotul din aer - fixarea azotului.

Bacteriile Amylis devin o sursă de materie organică naturală reutilizabilă. (amonificare $N > NH_3$ organic)

Doza : 0.5 L/ha într-un volum de apă de 200L/ha. Se aplică la sol, sau prin irigare/picurare/pulverizare.

Compoziție w/v :

Suspensie lichidă bacteriană, în soluție pură, cu o concentrație 109 UFC/ml.

Îngrășământ pe bază de *Bacillus amyloliquefaciens* - 2 tulpini I4995 și I4996 de la Institutul Pasteur. Unitatea de formare a coloniei / ml



Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică,
în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007. Produs certificat .

Descriere produs:

Oceanum este un extract pur de alge marine (puritate 100% ASCOPHYLLUM NODOSUM), un biostimulator cu nutrienți de înaltă calitate. Poate fi folosit pe toate culturile, atât prin aplicare foliară cât și prin sistemul de irigare. Prin concentrația mare de acid alginic, manitol și fitohormoni naturali, Oceanum este biostimulatorul perfect pentru culturile afectate, sau pentru etapele de dezvoltare critice. Potasiul este de origine integral naturală, în concentrație de 18%.

Oceanum se aplică : În situațiile critice - ajută la recuperare.

Pentru a îmbunătăți performanța.

Pentru dezvoltarea intensivă a culturilor.

Pentru a crește gradul de înflorire și polenizare.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Se aplică foliar.

Aplicare foliară: 100-200 gr / hl.

Aplicare la sol: 2-5 kg / ha.

Oceanum se aplică la următoarele culturi :

Viță de vie — înainte și după înflorit.

Cereale păioase : la desprindere sau în faza de burduf.

Răpă : la desprindere sau în perioada preflorală.

Floarea-soarelui : în faza de 4-6 frunze sau în faza de buton floral.

Legume : după transplantare, în faza de buton floral sau în etapa de creștere a fructelor.

Pomi fructiferi : înainte sau după înflorit.

Soia : în faza de 4-6 frunze.

Sfecla de zahar : în faza de 3-5 frunze.

Porumb : la faza de 6-8 frunze sau la ultimul tratament efectuat.

Ambalaj: 5Kg

Compoziție w/v :

Extracte de alge de origine naturală ASCOPHYLLUM NODOSUM.

Materie organică : 50%.

Acid alginic : 14%.

Potasiu (K₂O) : 18%.

Manitol, citokinine, gibereline.



OCEANUM



Recomandări de aplicare :

Nu faceți amestecuri cu produse pe bază de sulf, calciu, uleiuri, sulfati, acizi sau baze puternice.

Dacă aveți nelămuriri, vă recomandăm să efectuați un test preliminar. A se păstra în ambalajul original, la loc ferit de umiditate. Evitați utilizarea produsului la temperaturi mai mari de 25 de grade Celsius.



Recomandări de aplicare :

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Compatibilitate:

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.

Compoziție w/v :

CaCO₃ – 50%
CaO – 25%.
MgO – 1.8%.
B – 5%.
SiO₂ – 9%.
Fe – 1%.
Mn – 0.02%



Producător:  **TRIBODYN**

Unic Importator

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007 & 889/2008. Produs certificat FiBL.

Descriere produs:

Dolomitul selectat este activat tribodinamic printr-un proces special și ulterior este măcinat la dimensiuni foarte fine. Pulverizarea Lithovit B pe aparatul foliar al plantelor crește semnificativ concentrația de CO₂ pe suprafața foliară, datorită carbonatului de calciu. Lithovit B crește semnificativ rezistența pereților celulari, dar asigură și aportul de calciu, bor, siliciu, mangan, fier și magneziu.

Lithovit poate fi aplicat la startul în vegetație al culturii, la începutul perioadei de înflorit sau la maturarea fructelor, în doza de 1-1.5 kg/ha (0.5 kg în 100 L de soluție), păstrând un interval de pauză de două săptămâni între tratamente.

Avantajele utilizării Lithovit B sunt :

Creșterea nivelului fotosintezei.

Consum mai redus de apă.

Creșterea accelerată.

Randamente mai bune ale culturilor.

Toleranța mai bună la îngheț și secetă.

Îmbunătățirea activităților metabolice.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Se aplică foliar.

Rapiță : 1-1.5 kg/ha. Înaintea perioadei de înflorit.

Floarea-soarelui : 1-1.5 kg/ha, în faza de formare a calatidiului.

Ceapă, usturoi : 1.5 kg/ha, creșterea sistemului radicular.

Fasole, mazăre, varză, salată : 1 kg/ha, înaintea perioadei de înflorit.

Soia : 1.5 kg/ha, înaintea perioadei de înflorit.

Pomi fructiferi : 1.5 kg/ha, înaintea perioadei de înflorit.

Viță de vie : 1.5 kg/ha, înaintea perioadei de înflorit.

Ambalaj: 20Kg

Produs permis pentru a fi utilizat în agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul CE 834 / 2007 . Produs certificat .

Descriere produs:

Ecobor este un fertilizant foliar certificat ECO, formulat ca și concentrat lichid de bor, cu un conținut de 150 gr/L. Borul joacă un rol important pentru asigurarea unei creșteri normale a plantelor de cultură și pentru îmbunătățirea unor indici de calitate ai recoltei (conținutul în ulei la plantele oleaginoase, conținutul în zahăr la sfeclă).

Borul mărește fertilitatea florilor pentru că stimulează producerea de polen și îmbunătățește viabilitatea acestuia.

Deficiența în bor se manifestă prin: moartea vârfurilor de creștere , care rămân pitice, apariția crăpăturilor sau brunificarea țesuturilor în sistemul radicular sau la nivelul tulpinilor.

Modul de utilizare și dozele recomandate :

Se aplică foliar.

Rapiță : 3 l/ha. Primul tratament se aplică în faza de patru frunze și al doilea tratament la desprimăvărare.

Floarea-soarelui : 3 litri/ha, în faza de 6-8 frunze.

Căpșun : 2.5 l/ha, 2 tratamente la interval de 15 zile.

Rădăcinoase : 2.5 l/ha, când plantele au 10 cm înălțime.

Fasole, mazăre, varză, salată : 2.5 l/ha, 2-3 aplicări, la interval de 15 zile.

Sfeclă de zahăr : 3 l/ha, primul tratament înainte ca plantele să acopere spațiul dintre rânduri. Maxim două-trei tratamente la interval de 14 zile.

Pomi fructiferi : 2.5 litri/ha, cu repetare la 15-20 de zile.

Ambalaj: 10 L

Compoziție w/v :

Bor (B) : 150 g/L, 11%.

ECOBOR



Recomandări de aplicare :

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. Agitați bine recipientul și adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul.

Compatibilitate:

A nu se amesteca cu produse pe bază de fosfați sau sulfiți.

Citiți întotdeauna etichetele produsului și urmați în permanență instrucțiunile producătorului. Când combinați cu alte produse, întotdeauna adăugați acest produs ultimul dar faceți și un test de compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultați producătorul sau distribuitorul.



Mihaela DORNEANU

Director General
0746 161 134
mihaela.dorneanu@agroest.ro

Constantin ZEVEDEI

Manager Vânzări Divizia Ferme
0742 138 987
constantin.zevedei@agroest.ro

Alexandru BRINCEANU

Manager Promovare & Distribuție
0756 061 281
alexandru.brinceanu@agroest.ro

Carmen MURARIU

Manager Regional România Sud-Est
0745 980 404
carmen.murariu@agroest.ro

Florin MITROI

Manager Regional România Sud
0742 139 094
florin.mitroi@agroest.ro

Cristian VLAD

Manager Regional România Sud-Vest
0727 811 507
cristian.vlad@agroest.ro

Constantin NASTASE

Manager Vânzări & Tehnic OT, DJ, AG
0741 265 968
constantin.nastase@agroest.ro

Alexandra SAMOILA

Manager Zonal Vânzări CT
0753 039 157
alexandra.samoila@agroest.ro

Adrian BADIN

Manager Zonal Vânzări BR
0747 018 636
adrian.badin@agroest.ro

Alexandru FILICENCO

Manager Zonal Vânzări TL
0753 039 118
alexandru.filicenco@agroest.ro

Alexandru Cristian TEODORESCU

Manager Zonal Vânzări AG
0753 039 161
alexandru.teodorescu@agroest.ro

Alina BADESCU

Manager Distribuție România Vest
0746 162 857
alina.badescu@agroest.ro

Bogdan VLAD

Manager Zonal Vânzări CT
0753 039 171
bogdan.vlad@agroest.ro

Constantin TANDARA

Manager Zonal Vânzări GL, VS
0746 169 038
constantin.tandara@agroest.ro

Cornel NASTASE

Manager Zonal Vânzări CL
0742 138 942
cornel.nastase@agroest.ro

Cosmin GROZAVU

Manager Zonal Vânzări CL
0753 039 173
cosmin.grozavu@agroest.ro

Ionela PETREA

Manager Zonal Vânzări TR, GR
0746 162 895
ionela.petrea@agroest.ro

Madalin PENU

Manager Distribuție România Nord-Est
0746 166 285
madalin.penu@agroest.ro

Oana STOIAN

Manager Zonal Vânzări BR
0746 161 176
oana.stoian@agroest.ro

Octavian Dorel IVANICA

Manager Zonal Vânzări DJ, MH, OT
0753 039 185
dorel.ivanica@agroest.ro

Radu MALACEA

Manager Zonal Vânzări PH, DB
0753 039 195
radu.malacea@agroest.ro

Simona VASILE

Manager Zonal Vânzări BZ
0753 039 158
simona.vasile@agroest.ro

Viorel ZIVICIU

Manager Zonal Vânzări IL
0756 060 845
viorel.ziviciu@agroest.ro

Viorel MEIROSU

Manager Zonal Vânzări IL
0746 169 829
viorel.meirosu@agroest.ro

Marilena GERU

Manager Dep. CSR
0746 169 057
marilena.geru@agroest.ro

Cristina STEFANESCU

CSR
0745 753 187
cristina.stefanescu@agroest.ro

Mihaela DONIGA

CSR
0746 169 103
mihaela.doniga@agroest.ro

Anca STOICAN

CSR
0753 039 148
anca.stoican@agroest.ro



Localitatea Cioranca 131 | Jud. Buzău | T 0756 061 281 | E vanzari@agroest.ro
www.agroest.ro

 [agro-est muntania](https://www.facebook.com/agro-est-muntania)